

Εισαγωγή: Βασικές έννοιες για σταθμητούς χώρους

Σ' αυτό το μάθημα θα εργαζόμαστε σε πραγματικούς γραμμικούς χώρους. Θυμίζουμε τον από την Γραμμική Άλγεβρα γνωστό ορισμό.

1.1 Ορισμός Ένας πραγματικός γραμμικός χώρος είναι μια τριάδα  $(X, +, \cdot)$  που συνίσταται από ένα σύνολο  $X$ , μια πράξη  $+$  (πρόσθεση)

$$+ : X \times X \longrightarrow X$$

$$(x, y) \longmapsto x+y$$

και μια πράξη  $\cdot$  (πολλαπλασιασμός πραγματικών αριθμών με διανύσματα)

$$\cdot : \mathbb{R} \times X \longrightarrow X$$

$$(\lambda, x) \longmapsto \lambda x$$

για τις οποίες ισχύουν:

ΓΧ1  $(X, +)$  είναι αβελιανή ομάδα, δηλαδή

$$\forall x, y, z \in X : (x+y)+z = x+(y+z)$$

$$\exists 0 \in X \forall x \in X : 0+x = x$$

$$\forall x \in X \exists x' \in X : x+x' = 0 \quad (\text{συμβολισμός } x' = -x)$$

$$\forall x, y \in X : x+y = y+x$$

ΓΧ2 Για  $x, y \in X$  και  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  ισχύει

$$(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$$

$$\lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y$$

$$(\lambda \mu)x = \lambda(\mu x)$$

$$1x = x$$

Αν οι πράξεις  $+, \cdot$  είναι προφανείς (ή χωρίς σημασία) τότε γράφουμε  $X$  αντί για  $(X, +, \cdot)$ . Όταν στο εξής μιλάμε για γραμμικούς χώρους θα εννοούμε πάντα πραγματικούς γραμμικούς χώρους.

Γενικεύοντας την έννοια της απόλυτης τιμής στον  $\mathbb{R}$  σε έναν γραμμικό χώρο  $X$  έχουμε την δυνατότητα να μετράμε μήκη διανυσμάτων του  $X$ . Η γενίκευση αυτή μας οδηγεί στην γι' αυτό το μάθημα θεμελιώδη έννοια της στάθμης.

1.2 Ορισμός Έστω  $X$  ένας γραμμικός χώρος. Μια απεικόνιση

$$\|\cdot\| : X \longrightarrow \mathbb{R}$$


$$x \longmapsto \|x\|$$

λέγεται στάθμη (norm, νόρμη, νόρμα), αν ισχύουν:

$$\Sigma 1 \quad x \in X \quad \|x\| = 0 \iff x = 0$$

$$\Sigma 2 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall x \in X \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$$

$$\Sigma 3 \quad \forall x, y \in X \quad \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\text{τριγωνική ανισότητα}).$$



Ένας γραμμικός χώρος  $X$  στον οποίο έχει οριστεί μία στάθμη λέγεται σταθμητός χώρος (ή χώρος με norm), συμβολισμός  $(X, \|\cdot\|)$ .

Σημείωση: Από τα αξιώματα της στάθμης έπεται ότι για κάθε  $x \in X$  ισχύει  $\|x\| \geq 0$ . Πραγματικά με  $y := -x$  έχουμε

$$0 = \|x-x\| \leq \|x\| + \|-x\| = \|x\| + \|x\| = 2\|x\|$$

όπου στην πρώτη ανισότητα χρησιμοποιήσαμε την  $\Sigma 3$  και στην προτελευταία ισότητα την  $\Sigma 2$ .

Παραδείγματα

1.  $(\mathbb{R}, \|\cdot\|)$  με  $\forall x \in \mathbb{R} \quad \|x\| := |x|$ .

2. Έστω  $-\infty < a < b < +\infty$ ,  $C[a,b] := \{f / f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ συνεχής}\}$ . Ο  $C[a,b]$  με τις πράξεις  $(f+\varphi)(x) := f(x)+\varphi(x)$ ,  $(\lambda f)(x) := \lambda f(x)$  είναι ένας γραμμικός χώρος.

Για  $p \geq 1$  ορίζουμε  $\forall f \in C[a,b] \quad \|f\|_p := \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p}$ ,

$\|f\|_\infty := \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$  (για  $f \in C[a,b]$  ισχύει προφανώς  $\|f\|_p, \|f\|_\infty < +\infty$ ).

Θα δείξουμε τώρα ότι για  $1 \leq p < +\infty$  ο  $(C[a,b], \|\cdot\|_p)$  είναι ένας σταθμητός χώρος.

i.  $p = +\infty$

Ισχύουν:

$\Sigma 1$  για  $f \in C[a,b] \quad \|f\|_\infty = 0 \iff \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| = 0 \iff f = 0$ .

$\Sigma 2$  για  $\lambda \in \mathbb{R}, f \in C[a,b], \|\lambda f\|_\infty = \max_{a \leq x \leq b} |\lambda f(x)| = |\lambda| \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| = |\lambda| \|f\|_\infty$

$\Sigma 3$  για  $f, \varphi \in C[a,b]$

$$\begin{aligned} \|f+\varphi\|_\infty &= \max_{a \leq x \leq b} |f(x)+\varphi(x)| \leq \max_{a \leq x \leq b} [|f(x)|+|\varphi(x)|] \leq \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| + \max_{a \leq x \leq b} |\varphi(x)| = \\ &= \|f\|_\infty + \|\varphi\|_\infty. \end{aligned}$$

ii.  $p = 1$

Ισχύουν:

$\Sigma 1$  για  $f \in C[a,b] \quad \|f\|_1 = 0 \iff \int_a^b |f(x)| dx = 0 \iff f = 0$ .

$\Sigma 2$  για  $\lambda \in \mathbb{R}, f \in C[a,b] \quad \|\lambda f\|_1 = \int_a^b |\lambda f(x)| dx = |\lambda| \int_a^b |f(x)| dx = |\lambda| \|f\|_1$ .

$\Sigma 3$  για  $f, \varphi \in C[a,b]$

$$\begin{aligned} \|f+\varphi\|_1 &= \int_a^b |f(x)+\varphi(x)| dx \leq \int_a^b [|f(x)|+|\varphi(x)|] dx = \\ &= \int_a^b |f(x)| dx + \int_a^b |\varphi(x)| dx = \|f\|_1 + \|\varphi\|_1. \end{aligned}$$

iii.  $1 < p < +\infty$

Κατ' αρχήν ισχύουν:

$\Sigma 1$  για  $f \in C[a,b] \quad \|f\|_p = 0 \iff \int_a^b |f(x)|^p dx = 0 \iff f = 0$ .

$\Sigma 2$  για  $\lambda \in \mathbb{R}, f \in C[a,b]$

$$\|\lambda f\|_p = \left( \int_a^b |\lambda f(x)|^p dx \right)^{1/p} = \left( \int_a^b |\lambda|^p |f(x)|^p dx \right)^{1/p} = |\lambda| \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} = |\lambda| \|f\|_p$$

Για να αποδείξουμε την τριγωνική ανισότητα χρησιμοποιούμε την ανισότητα του Hölder για ολοκληρώματα

$$\int_a^b |f(x)\varphi(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{1/p} \left(\int_a^b |\varphi(x)|^q dx\right)^{1/q} \quad (= \|f\|_p \|\varphi\|_q),$$


όπου  $p > 1$  και  $1/p + 1/q = 1$ .

Απόδειξη της ανισότητας του Hölder

Η απόδειξη βασίζεται στην ανισότητα

$$(*) \quad \xi\eta \leq \xi^p/p + \eta^q/q, \quad \xi, \eta \geq 0$$

Γεωμετρική σημασία της (\*):



$$\begin{aligned} E_1 &= \int_0^\xi x^{p-1} dx = \frac{x^p}{p} \Big|_0^\xi = \frac{\xi^p}{p} \\ E_2 &= \int_0^\eta \frac{1}{y^{1/p}} dy = \frac{y^{1-1/p}}{1-1/p} \Big|_0^\eta = \frac{y^{1/q}}{1/q} \Big|_0^\eta = \frac{\eta^q}{q} \end{aligned}$$

$$E_1 = \xi^p/p, \quad E_2 = \eta^q/q, \quad \xi\eta \leq E_1 + E_2$$

$$\text{όπου } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \Rightarrow \frac{1}{p} = 1 - \frac{1}{q} \Rightarrow \frac{1}{p} = \frac{q-1}{q} \Rightarrow \frac{1}{p} = \frac{q-1}{q}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{p} = \frac{q-1}{q} \Rightarrow \frac{1}{p} = \frac{q-1}{q}$$

Με  $r := \xi^p$ ,  $s := \eta^q$  η (\*) γράφεται ισοδύναμα σαν

$$(**) \quad r^{1/p} s^{1/q} \leq r/p + s/q. \quad (\Leftrightarrow \frac{r^{1/p} s^{1/q}}{r/p} \leq \frac{r/p + s/q}{r/p} = \left(\frac{s}{r}\right)^{1/q} < \frac{1}{p} \left(\frac{s}{r}\right)^{1-1/p}$$

Για  $r=s$  η (\*\*\*) είναι προφανής. Έστω χωρίς περιορισμό της γενικότητας  $r > s$  (λόγω συμμετρίας). Η (\*\*\*) γράφεται τότε

$$(r/s)^{1/p} \leq (1/p)(r/s) + (1/q) = 1 + (1/p)(r/s - 1) \quad (\text{λόγω } 1/p + 1/q = 1).$$

Για  $t > 1$  έχουμε με  $g(t) := t^{1/p}$ ,  $g(t) = g(1) + (t-1)g'(ξ)$ ,  $1 < ξ < t$ , δηλαδή

$$t^{1/p} = 1 + (1/p)(t-1)(1/ξ^{1-1/p}) < 1 + (1/p)(t-1), \text{ οπότε με } t := r/s$$

παίρνουμε το ζητούμενο.

Τώρα με  $\xi := |f(x)|/\|f\|_p$ ,  $\eta := |\varphi(x)|/\|\varphi\|_q$  από την (\*) έχουμε

$$|f(x)\varphi(x)| / (\|f\|_p \|\varphi\|_q) \leq (|f(x)|^p / (p\|f\|_p^p)) + (|\varphi(x)|^q / (q\|\varphi\|_q^q))$$

οπότε ολοκληρώνοντας παίρνουμε

$$\int_a^b |f(x)\varphi(x)| dx / (\|f\|_p \|\varphi\|_q) \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx / (p\|f\|_p^p)\right) + \left(\int_a^b |\varphi(x)|^q dx / (q\|\varphi\|_q^q)\right) = 1/p + 1/q = 1.$$

Με την βοήθεια της ανισότητας του Hölder δεύχνουμε τώρα την τριγωνική ανισότητα που στην προκειμένη περίπτωση λέγεται και ανισότητα του Minkowski.

Έχουμε

$$(***) \quad \int_a^b |f(x)+\varphi(x)|^p dx \leq \int_a^b |f(x)+\varphi(x)|^{p-1} |f(x)| dx + \int_a^b |f(x)+\varphi(x)|^{p-1} |\varphi(x)| dx$$

$$\leq \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \left( \int_a^b |f(x)+\varphi(x)|^{(p-1)q} dx \right)^{1/q} + \left( \int_a^b |\varphi(x)|^p dx \right)^{1/p} \left( \int_a^b |f(x)+\varphi(x)|^{(p-1)q} dx \right)^{1/q} =$$

$$= \left( \int_a^b |f(x)+\varphi(x)|^{(p-1)q} dx \right)^{1/q} [ \|f\|_p + \|\varphi\|_p ] = \left( \int_a^b |f(x)+\varphi(x)|^p dx \right)^{1/p} [ \|f\|_p + \|\varphi\|_p ]$$

οπότε

$$\left( \int_a^b |f(x)+\varphi(x)|^p dx \right)^{1/p} \leq \|f\|_p + \|\varphi\|_p$$

δηλαδή

$$\|f+\varphi\|_p \leq \|f\|_p + \|\varphi\|_p \quad (\text{ανισότητα του Minkowski}).$$

Σημείωση: Για να ισχύει ισότητα στην (\*) πρέπει προφανώς να έχουμε  $\xi = \eta$ .  
 Στην (\*\*\*) ισχύει ισότητα αν  $f(x), \varphi(x)$  είναι ομόσημα. Εύκολα  
 τώρα διαπιστώνουμε ότι ισότητα στην ανισότητα του Minkowski  
 συνεπάγεται ότι οι συναρτήσεις είναι γραμμικά εξαρτημένες.

3. Έστω  $w \in C[a, b]$  μια συνάρτηση βάρους,  $\forall x \in [a, b] \quad w(x) > 0$ , και  $p \geq 1$ .  
 Με  $\forall f \in C[a, b] \quad \|f\|_{w,p} := \left( \int_a^b w(x) |f(x)|^p dx \right)^{1/p}$  ο  $(C[a, b], \|\cdot\|_{w,p})$  είναι  
 ένας σταθμητός χώρος. Η απόδειξη γίνεται όπως και στο δεύτερο παράδειγμα.

4.  $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$  όπου  $p \geq 1$  και για  $x \in \mathbb{R}^n \quad \|x\|_p := \left( \sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p}$  για  $p < \infty$ , και  
 $\|x\|_\infty := \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$ .

Η απόδειξη είναι και εδώ ανάλογη εκείνης του δεύτερου παραδείγματος.

Σε σταθμητούς χώρους μπορούμε να ορίσουμε την έννοια της σύγκλισης και  
 συνεπώς και την έννοια μιας συνεχούς απεικόνισης μεταξύ σταθμητών χώρων.

1.3 Ορισμός Έστω  $(X, \|\cdot\|)$  ένας σταθμητός χώρος. Λέμε ότι μια ακολουθία  
 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$  συγκλίνει προς ένα στοιχείο  $x \in X$ , αν ισχύει

$$\|x_n - x\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Όταν είναι προφανές ως προς ποιά στάση εννοούμε τη σύγκλιση, γράφουμε  
 $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$ , διαφορετικά γράφουμε  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$  στον  $(X, \|\cdot\|)$ .

1.4 Ορισμός Έστω  $(X, \|\cdot\|), (Y, \|\cdot\|')$  δύο σταθμητούς χώροι. Μία απεικόνιση  
 $T: M \rightarrow Y, M \subset X$ , λέγεται συνεχής στο σημείο  $x \in M$ , αν:

$$\left( (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset M, x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x \right) \implies T(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} T(x)$$

δηλαδή

$$\left( \|x_n - x\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \right) \implies \|T(x_n) - T(x)\|' \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Η  $T$  λέγεται συνεχής σ' ένα σύνολο  $M_1 \subset M$ , αν είναι συνεχής σε κάθε σημείο  
 του  $M_1$ .

Θα γνωρίσουμε τώρα μερικά αποτελέσματα για συμπαγή σύνολα και συνεχείς  
 συναρτήσεις ορισμένες σε συμπαγή σύνολα, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε

στο επόμενο κεφάλαιο για την απόδειξη υπάρξεως βελτίστων προσεγγύσεων.

1.5 Ορισμός Έστω  $(X, || \cdot ||)$  ένας σταθμητός χώρος και  $K \subset X$ .

- i. Το  $K$  λέγεται κλειστό, αν  $( (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K, x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x ) \implies x \in K$  το όριο δηλαδή κάθε συγκλίνουσα ακολουθία του  $K$  ανήκει στο  $K$ .
- ii. Το  $K$  λέγεται φραγμένο, αν  $\exists c \forall x \in K \ ||x|| \leq c$ .
- iii. Το  $K$  λέγεται συμπαγές, αν κάθε ακολουθία  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$  έχει μια συγκλίνουσα υποακολουθία  $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  που το όριο της ανήκει στο  $K$ .

Παράδειγμα: Στον  $(\mathbb{R}, | \cdot |)$  το σύνολο  $[a, b]$  (όπου  $-\infty < a < b < +\infty$ ) είναι κλειστό, φραγμένο και συμπαγές. Το σύνολο  $[a, b)$  είναι φραγμένο αλλά μη κλειστό, το  $\mathbb{R}$  είναι κλειστό αλλά μη φραγμένο.

1.6 Λήμμα Έστω  $(X, || \cdot ||)$  ένας σταθμητός χώρος και  $K$  ένα συμπαγές υποσύνολο του  $X$ . Αν  $M \subset K$  κλειστό, τότε το  $M$  είναι συμπαγές.

Απόδειξη

Έστω  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset M$ . Τότε προφανώς  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$  συνεπώς υπάρχει υποακολουθία  $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  και  $x^* \in K$  τέτοια ώστε  $x_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x^*$ . Λόγω της κλειστότητας του  $M$  ισχύει όμως  $x^* \in M$ .

1.7 Πρόταση Έστω  $(X, || \cdot ||), (Y, || \cdot ||')$  σταθμητοί χώροι και  $T: X \rightarrow Y$  μια συνεχής απεικόνιση. Αν  $K \subset X$  συμπαγές, τότε και  $M := T(K) (= \{y \in Y : \exists x \in K \ y = T(x)\})$  είναι συμπαγές.

(Η "συνεχής" εικόνα συμπαγούς είναι συμπαγής).

Απόδειξη

Έστω  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset M$ . Τότε αν  $x_n \in K$  τέτοιο ώστε  $y_n = T(x_n)$  λόγω της συμπαγείας του  $K$  η ακολουθία  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$  έχει μια συγκλίνουσα υποακολουθία  $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  με  $x_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x^* \in K$ . Λόγω της συνέχειας της  $T$  έχουμε τότε  $\lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} T(x_{n_k}) = T(\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}) = T(x^*) \in M$ .

Μια συνεχής συνάρτηση  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  λαμβάνει στο  $[a, b]$  ως γνωστόν το μέγιστο και το ελάχιστο της. Μια γενίκευση αυτού του γεγονότος δύναται αμέσως.

1.8 Πρόταση Έστω  $(X, || \cdot ||)$  ένας σταθμητός χώρος,  $K$  ένα συμπαγές υποσύνολο του  $X$  και  $f: K \rightarrow \mathbb{R}$  μια συνεχής συνάρτηση (στο  $K$ ). Τότε υπάρχουν δύο σημεία  $x^*, x_* \in K$  τέτοια ώστε :

$$f(x^*) = \sup_{x \in K} f(x) \quad , \quad f(x_*) = \inf_{x \in K} f(x).$$

(Μια συνεχής συνάρτηση λαμβάνει σε κάθε συμπαγές σύνολο το μέγιστο και το ελάχιστό της).

Απόδειξη:

Έστω  $M := f(K)$ . Τότε  $\sup_{x \in K} f(x) = \sup M$ . Έστω  $\alpha := \sup M$ . Τότε υπάρχει μια

ακολουθία  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset M$  με  $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \alpha$ . Λόγω της συμπαγείας του  $M$  ισχύει  $\alpha < +\infty$  και  $\alpha \in M$ . Άρα  $\exists x^* \in K \ f(x^*) = \alpha$ . Για το  $\inf$  θέσε  $\varphi := -f$  και χρησιμοποίησε το ήδη αποδεδειχθέν για την  $\varphi$ .

θα δώσουμε τώρα μια αναγκαία συνθήκη για να είναι ένα υποσύνολο ενός σταθμητού χώρου συμπαγές.

1.9 Λήμμα Έστω  $(X, \|\cdot\|)$  ένας σταθμητός χώρος και  $K \subset X$ . Αν  $K$  συμπαγές τότε το  $K$  είναι κλειστό και φραγμένο.

Απόδειξη

$K$  κλειστό: Έστω  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$  με  $x_n \rightarrow x$ . Τότε προφανώς κάθε υπακολουθία της  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  συγκλίνει επίσης προς το  $x$ , λόγω της συμπαγείας του  $K$  ισχύει συνεπώς  $x \in K$ .

$K$  φραγμένο: Λόγω  $\|x_n\| \leq \|x_n - x\| + \|x\|$ , έχουμε κατ' αρχήν ότι κάθε συγκλίνουσα ακολουθία σε έναν σταθμητό χώρο είναι φραγμένη. Έστω τώρα ότι το  $K$  δεν είναι φραγμένο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ακολουθία  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$  με  $\|x_n\| \geq n$ . Τότε όμως κάθε υπακολουθία αυτής της ακολουθίας είναι μη φραγμένη, άρα μη συγκλίνουσα, άτοπο λόγω της συμπαγείας του  $K$ .

Το αντίστροφο του ανωτέρω λήμματος ισχύει μόνο σε χώρους πεπερασμένης διαστάσεως. Δίνουμε πρώτα την απόδειξη για μια ειδική περίπτωση.

1.10 Πρόταση (Heine-Borel) Κάθε κλειστό και φραγμένο υποσύνολο του  $(\mathbb{R}^m, \|\cdot\|_\infty)$  είναι συμπαγές.

Απόδειξη

Κατ' αρχήν δείχνουμε επαγωγικά ως προς  $m$  ότι το σύνολο  $K_m := \{x \in \mathbb{R}^m : \|x\|_\infty \leq 1\}$  είναι συμπαγές.

$m=1$ : Κάθε ακολουθία  $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \subset [-1, 1]$  είναι φραγμένη, έχει συνεπώς σύμφωνα με το θεώρημα των Bolzano-Weierstrass μια συγκλίνουσα υπακολουθία. Λόγω της κλειστότητας του  $[-1, 1]$  το όριο θα βρίσκεται στο  $[-1, 1]$ , άρα το  $[-1, 1]$  είναι συμπαγές.

$m \rightarrow m+1$ : Έστω  $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \subset K_{m+1}$ . Γράφουμε τα στοιχεία του  $\mathbb{R}^{m+1}$  στη μορφή  $x = (y, x_{m+1})$ , όπου το  $y = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ . Τώρα έχουμε την ακολουθία  $(y^{(n)}, x_{m+1}^{(n)})$ . Λόγω  $(x_{m+1}^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \subset [-1, 1]$  υπάρχει μια συγκλίνουσα υπακολουθία της, έστω  $(x_{m+1}^{(n_k)})_{k \in \mathbb{N}}$ . Σύμφωνα με την υπόθεση της επαγωγής η ακολουθία  $(y^{(n_k)})_{k \in \mathbb{N}} \subset K_m$  έχει μια συγκλίνουσα υπακολουθία  $(y^{(n_{k_l})})_{l \in \mathbb{N}}$ . Τώρα προφανώς η υπακολουθία της  $(x^{(n_{k_l})})_{l \in \mathbb{N}}$  συγκλίνει και το όριο της βρίσκεται στο  $K_{m+1}$ . Άρα το  $K$  είναι συμπαγές.

Έστω τώρα  $K$  ένα τυχαίο κλειστό και φραγμένο υποσύνολο του  $\mathbb{R}^m$ . Τότε υπάρχει  $c > 0$  τέτοιο ώστε  $K \subset cK_m$ . Η απεικόνιση  $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m, x \mapsto cx$  είναι προφανώς συνεχής, σύμφωνα με την πρόταση 1.7 το  $cK$  είναι λοιπόν συμπαγές. Αφού το  $K$  είναι κλειστό σύμφωνα με το λήμμα 1.6 είναι και συμπαγές.

Γενικεύουμε τώρα την προηγούμενη πρόταση.

1.11 Θεώρημα Έστω  $(X, \|\cdot\|)$  ένας σταθμητός χώρος πεπερασμένης διαστάσεως. Αν  $K \subset X$  κλειστό και φραγμένο, τότε το  $K$  είναι συμπαγές.

Απόδειξη

Έστω  $\{x_1, \dots, x_m\}$  μια βάση του  $X$ . Η απεικόνιση

$$T : (\mathbb{R}^m, \|\cdot\|_\infty) \longrightarrow (X, \|\cdot\|) \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \longrightarrow (\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_m x_m)$$

είναι συνεχής. Πραγματικά

$$\|T\lambda - T\mu\| = \left\| \sum_{k=1}^m (\lambda_k - \mu_k) x_k \right\| \leq \sum_{k=1}^m |\lambda_k - \mu_k| \|x_k\| \leq \|\lambda - \mu\|_\infty \sum_{k=1}^m \|x_k\| = c \|\lambda - \mu\|_\infty$$

όπου  $c := \sum_{k=1}^m \|x_k\|$ ,

οπότε  $(\mu \rightarrow \lambda) \implies (T\mu \rightarrow T\lambda)$ .

Έστω  $M := \overline{T(K)}$  ( $:= \{\lambda \in \mathbb{R}^m : T\lambda \in K\}$ ). Τότε προφανώς  $K = T(M)$ , οπότε αν δείξουμε ότι το  $M$  είναι συμπαγές από την πρόταση 1.7 θα έχουμε και την συμπαγή του  $K$ . Σύμφωνα με την πρόταση 1.10 αρκεί να δείξουμε ότι το  $M$  είναι κλειστό και φραγμένο.

**M κλειστό:** Έστω  $(\lambda^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \in M$ ,  $\lambda^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda$ . Τότε

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T(\lambda^{(n)}) = T(\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda^{(n)}) = T(\lambda).$$

όπου η πρώτη ισότητα ισχύει γιατί η  $T$  είναι συνεχής.

Λόγω  $(T(\lambda^{(n)}))_{n \in \mathbb{N}} \in K$ ,  $T(\lambda^{(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T(\lambda)$ , και της κλειστότητας του  $K$  έπεται  $T(\lambda) \in K$ , συνεπώς  $\lambda \in M$ , άρα  $M$  κλειστό.

**M φραγμένο:** Έστω  $\alpha := \min\{\|T(\lambda)\| : \lambda \in \mathbb{R}^m, \|\lambda\|_\infty = 1\}$  (την δυνατότητα να γράψουμε εδώ  $\min$  αντ'  $\inf$  μας δίνει το γεγονός ότι η στάθμη είναι συνεχής συνάρτηση (άσκηση 1.4), η σύνθεση συνεχών συναρτήσεων είναι συνεχής, και η πρόταση 1.8). Προφανώς ισχύει  $\alpha > 0$ , γιατί τα  $x_1, \dots, x_m$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Τώρα λόγω της γραμμικότητας της απεικόνισης  $T$  έχουμε για  $\lambda \neq 0$

$$\|T(\lambda)\| = \left\| T\left(\frac{1}{\|\lambda\|_\infty} \lambda\right) \right\| \|\lambda\|_\infty \geq \alpha \|\lambda\|_\infty,$$

απ' όπου, λόγω του ότι το  $K$  είναι φραγμένο, έπεται ότι και το  $M$  είναι φραγμένο.

Ασκήσεις

1.1 i. Έστω  $p > 1$ . Στον  $\mathbb{R}^n$  ορίζουμε την απεικόνιση

$$\|\cdot\|_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad \|x\|_p := \left( \sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p}.$$

Δεξτε ότι η  $\|\cdot\|_p$  είναι στάθμη.

ii. Έστω  $w \in C[a,b]$  μια συνάρτηση βάρους, δηλ.  $\forall x \in [a,b] \quad w(x) > 0$ , και  $p > 1$ . Δεξτε ότι η απεικόνιση  $\|\cdot\|_{w,p} : C[a,b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$\|f\|_{w,p} := \left( \int_a^b w(x) |f(x)|^p dx \right)^{1/p}$$
 είναι μια στάθμη στον  $C[a,b]$ .

1.2 Στον  $\mathbb{R}^n$  ορίζουμε την στάθμη  $\|\cdot\|_\infty$  δια

$$\|x\|_\infty := \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|.$$

Δεξτε ότι για  $x \in \mathbb{R}^n$  ισχύει  $\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$ .

1.3 Έστω  $(X, \|\cdot\|)$  ένας σταθμητός χώρος πεπερασμένης διαστάσεως. Δεξτε ότι ο  $X$  είναι πλήρης, ότι δηλαδή κάθε ακολουθία Cauchy στον  $X$  συγκλίνει. — (Μια ακολουθία  $(x_n) \subset X$  λέγεται ακολουθία Cauchy, αν ισχύει:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m > N \quad \|x_n - x_m\| < \epsilon.$$

Υπόδειξη: Δεξτε κατ' αρχήν ότι κάθε ακολουθία Cauchy είναι φραγμένη.

1.4 Έστω  $(X, \|\cdot\|)$  ένας σταθμητός χώρος. Δεξτε ότι η στάθμη είναι συνεχής συνάρτηση.

1.5 Έστω  $X$  ένας γραμμικός χώρος και  $\|\cdot\|, \|\cdot\|'$  δύο στάθμες στον  $X$ . Δεξτε ότι αν ο  $X$  είναι πεπερασμένης διαστάσεως τότε οι στάθμες  $\|\cdot\|, \|\cdot\|'$  είναι ισοδύναμες, δηλαδή

$$\exists C, c > 0 \forall x \in X \quad c\|x\|' \leq \|x\| \leq C\|x\|'.$$

Με ένα αντιπαράδειγμα δεξτε ότι σε έναν απειροδιάστατο χώρο δύο στάθμες δεν είναι υποχρεωτικά ισοδύναμες.

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε το θεώρημα 1.11 και την απόδειξη του.



2. Βέλτιστες προσεγγύσεις : Ύπαρξη - Μοναδικότητα

---

Αφού ορίσουμε την έννοια της βέλτιστης προσέγγισης σε σταθμητούς χώρους δίνουμε συνθήκες για την ύπαρξη και την μοναδικότητα όταν προσεγγίζουμε από υποσύνολα που περιέχονται σε υπόχωρους πεπερασμένης διαστάσεως.

2.1 Ορισμός Έστω  $(X, \|\cdot\|)$  ένας σταθμητός χώρος,  $K \subset X$ ,  $x \in X$ . Ένα στοιχείο  $x' \in K$  (αν υπάρχει) για το οποίο ισχύει

$$\forall y \in K \quad \|x - x'\| \leq \|x - y\|$$

λέγεται βέλτιστη προσέγγιση του  $x$  από το  $K$ .

2.2 Ορισμός Έστω  $(X, \|\cdot\|)$  ένας σταθμητός χώρος,  $K \subset X$ ,  $x \in X$ . Το μέγεθος  $d(x, K) := \inf_{y \in K} \|x - y\|$  λέγεται απόσταση του  $x$  από το  $K$ .

Ένα στοιχείο  $x' \in K$  είναι λοιπόν βέλτιστη προσέγγιση του  $x$  από το  $K$  αν  $\|x - x'\| = d(x, K)$ .

Ύπαρξη βελτίστων προσεγγύσεων

Δείχνουμε τώρα την ύπαρξη βελτίστων προσεγγύσεων όταν το σύνολο από το οποίο προσεγγίζουμε είναι υπόχωρος πεπερασμένης διαστάσεως.

2.3 Θεώρημα (Θεμελιώδες θεώρημα της θεωρίας Προσεγγύσεων).

Έστω  $(X, \|\cdot\|)$  ένας σταθμητός χώρος και  $K$  ένας υπόχωρος του  $X$  πεπερασμένης διαστάσεως. Τότε

$$\forall x \in X \quad \exists x' \in K \quad \|x - x'\| = d(x, K) \quad ( = \inf_{y \in K} \|x - y\| ).$$

Απόδειξη

Δείχνουμε κατ' αρχήν ότι κάθε βέλτιστη προσέγγιση του  $x$  από το  $K$  βρίσκεται στο σύνολο  $S := \{y \in K : \|y\| \leq 2\|x\|\}$ . Πραγματικά για  $y \in K - S$  δηλαδή για  $y \in K$  με

$$\begin{aligned} \|y\| > 2\|x\| \text{ έχουμε } \|x - y\| &> \|y\| - \|x\| > 2\|x\| - \|x\| = \\ &= \|x\| = \|x - 0\| > \inf_{z \in K} \|x - z\| \end{aligned}$$

(λόγω  $0 \in K$ ). Τώρα το σύνολο  $S$  σαν κλειστό και φραγμένο υποσύνολο γραμμικού χώρου πεπερασμένης διαστάσεως είναι κατά το θεώρημα 1.11 συμπαγές.

Εξ' άλλου η συνάρτηση  $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\varphi(y) := \|x - y\|$ , είναι συνεχής, γιατί

$$|\varphi(y) - \varphi(z)| = | \|x - y\| - \|x - z\| | \leq \| (x - y) + (z - x) \| = \|y - z\|, \text{ οπότε}$$

$(y \rightarrow z) \implies (\varphi(y) \rightarrow \varphi(z))$ . Συνεπώς η  $\varphi$  λαμβάνει στο  $S$  το ελάχιστο της άρα υπάρχει  $x'$  τέτοιο ώστε

$$\|x - x'\| = \inf_{y \in S} \|x - y\| = \inf_{y \in K} \|x - y\|.$$

Μια γενίκευση αυτού του αποτελέσματος δίνεται στο επόμενο θεώρημα.

2.4 Θεώρημα Έστω  $(X, || \cdot ||)$  ένας σταθμητός χώρος,  $K \subset X$  κλειστό,  $K \neq \emptyset$  και  $K \subset X_1$  όπου  $X_1$  υπόχωρος του  $X$  πεπερασμένης διαστάσεως. Τότε για κάθε  $x \in X$  υπάρχει μια βέλτιστη προσέγγιση  $x'$  του  $x$  από το  $K$ .

Απόδειξη:

Η ιδέα είναι η ίδια όπως και στην απόδειξη του προηγούμενου θεωρήματος. Κάθε βέλτιστη προσέγγιση του  $x$  από το  $K$  βρίσκεται αναγκαστικά στο σύνολο  $M := \{y \in X_1 : ||y - x_1|| \leq 2||x - x_1||\}$  όπου  $x_1$  ένα τυχαίο αλλά σταθερό σημείο του  $K$ , και  $M \cap K$  είναι συμπαγές. Η λεπτομερής απόδειξη αφήνεται σαν άσκηση.

Παρατηρήσεις

- i. Για την ύπαρξη για κάθε  $x \in X$  μιας βέλτιστης προσέγγισης από το  $K$ , η κλειστότητα του  $K$  είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αν  $K$  μη κλειστό τότε υπάρχει ακολουθία  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$  με  $x_n \rightarrow x$ ,  $x \in X - K$ . Αλλά τότε  $d(x, K) = 0$  και  $\forall y \in K \quad ||x - y|| \neq 0$ , δηλαδή δεν υπάρχει βέλτιστη προσέγγιση του  $x$  από το  $K$ .
- ii. Το θεώρημα 2.3 είναι ειδική περίπτωση του θεωρήματος 2.4. Στην πράξη το σύνολο από το οποίο προσεγγίζουμε είναι σχεδόν πάντα ένας υπόχωρος.
- iii. Η υπόθεση ότι ο υπόχωρος  $K$  από τον οποίο προσεγγίζουμε είναι πεπερασμένης διαστάσεως είναι βασική στο θεώρημα 2.3 (όπως επίσης και ότι το  $K$  περιέχεται σε έναν πεπερασμένης διαστάσεως υπόχωρο στο θεώρημα 2.4). Πραγματικά έστω π.χ. ότι στον  $(C[0, 1/2], || \cdot ||_\infty)$  προσεγγίζουμε τη συνάρτηση  $f$ ,  $f(t) := 1/(1-t)$  από τον χώρο  $P$  των πολυωνύμων. Τότε  $d(f, P) = 0$ , γιατί η ακολουθία  $p_n$ ,  $p_n(t) := \sum_{k=0}^n t^k$ , συγκλίνει ομοιόμορφα προς την  $f$  ( $f(t) := \sum_{k=0}^{\infty} t^k$  και η σειρά συγκλίνει ομοιόμορφα προς την  $f$ ), αλλά προφανώς  $f \notin P$ , άρα  $\forall p \in P \quad ||f - p||_\infty \neq 0$ .

Μοναδικότητα βελτίστων προσεγγίσεων

Θα ασχοληθούμε εδώ με την περίπτωση προσεγγίσεως από υποχώρους. Κατ' αρχήν δείχνουμε ότι το σύνολο των βελτίστων προσεγγίσεων είναι κυρτό.

2.5 Πρόταση Έστω  $(X, || \cdot ||)$  ένας σταθμητός χώρος,  $X_1$  υπόχωρος του  $X$ , και  $x \in X$ . Το σύνολο  $B$  των βελτίστων προσεγγίσεων του  $x$  από το  $X_1$  είναι κυρτό.

Απόδειξη

Ένα υποσύνολο  $K$  ενός γραμμικού χώρου λέγεται ως γνωστόν κυρτό, αν

$$\forall x, y \in K, \forall \lambda \in [0, 1] : \lambda x + (1-\lambda)y \in K.$$

Αν  $B = \emptyset$ , τότε ο ισχυρισμός προφανώς αληθεύει.

Έστω  $x', x'' \in B$ , δηλαδή  $||x - x'|| = ||x - x''|| = d(x, X_1)$ . Για  $\lambda \in [0, 1]$  έχουμε τότε

$$\begin{aligned}
 ||x - [\lambda x' + (1-\lambda)x'']|| &= ||\lambda(x - x') + (1-\lambda)(x - x'')|| \leq \lambda ||x - x'|| + (1-\lambda)||x - x''|| = \\
 &= \lambda d(x, X_1) + (1-\lambda) d(x, X_1) = d(x, X_1),
 \end{aligned}$$

συνεπώς  $\lambda x' + (1-\lambda)x'' \in B$ , άρα  $B$  κυρτό.

Σημείωση Όταν προσεγγίζουμε από υποχώρους τότε σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση ή δεν υπάρχει προσέγγιση, ή υπάρχει ακριβώς μια, ή υπάρχουν άπειρες. βέλτιστη

Στα επόμενα θα χρησιμοποιήσουμε την έννοια των αυστηρά κυρτών σταθμητών χώρων. Ακριβέστερα θα δείξουμε ότι μόνο σε τέτοιους χώρους η βέλτιστη προσέγγιση για κάθε στοιχείο του χώρου και από κάθε υπόχωρο του πεπερασμένης διαστάσεως ορίζεται μονοσήμαντα. Ας δώσουμε όμως πρώτα τον ορισμό αυτής της

έννοιας.

2.6 Ορισμός Έστω  $(X, \|\cdot\|)$  ένας σταθμητός χώρος. Λέμε ότι η μοναδιαία σφαίρα του  $X$  (δηλαδή το σύνολο  $S := \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$ ) είναι αυστηρά κυρτή, αν ισχύει :

$$x, y \in X, x \neq y, \|x\| = \|y\| = 1 \implies \|(x+y)/2\| < 1.$$

Σ' αυτή την περίπτωση λέμε επίσης ότι η στάθμη  $\|\cdot\|$  είναι αυστηρά κυρτή, ή ακόμη ότι ο  $(X, \|\cdot\|)$  είναι αυστηρά κυρτός.

Μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αυστηρή κυρτότητα ενός σταθμητού χώρου δίνεται στο επόμενο λήμμα.

2.7 Λήμμα Έστω  $(X, \|\cdot\|)$  ένας σταθμητός χώρος. Τότε είναι ισοδύναμα:

- i.  $(X, \|\cdot\|)$  είναι αυστηρά κυρτός χώρος.
- ii.  $x, y \in X, \|x+y\| = \|x\| + \|y\| \implies x, y$  γραμμικά εξαρτημένα.

Απόδειξη

ii  $\implies$  i: Από τη ii έπεται αμέσως ότι για  $x, y \in X$  γραμμικά ανεξάρτητα ισχύει  $\|x+y\| < \|x\| + \|y\|$ .

Έστω τώρα  $x, y \in X, x \neq y, \|x\| = \|y\| = 1$ . Τότε προφανώς  $x = -y$  ή  $x, y$  γραμμικά ανεξάρτητα. Πραγματικά έχουμε

$$\begin{aligned} \alpha x + \beta y = 0 &\implies 0 = \|\alpha x + \beta y\| \geq | \|\alpha x\| - \|\beta y\| | = \\ &= | |\alpha| \|x\| - |\beta| \|y\| | = | |\alpha| - |\beta| | \end{aligned}$$

οπότε  $\alpha(x \pm y) = 0 \implies \alpha = 0, \beta = 0$ .

Για  $x = -y$  προφανώς  $0 = \|(x+y)/2\| < 1$ .

Για  $x, y$  γραμμικά ανεξάρτητα έχουμε:

$$\|(x+y)/2\| = 1/2 \|x+y\| < 1/2 (\|x\| + \|y\|) = 1/2 (1+1) = 1.$$

Συνεπώς ισχύει η i.

i  $\implies$  ii: Αρκεί να δείξουμε ότι αν η ii δεν ισχύει, δεν ισχύει ούτε η i. Αν δεν ισχύει η ii τότε υπάρχουν  $x, y \in X$  γραμμικά ανεξάρτητα τέτοια ώστε

$$\|x+y\| = \|x\| + \|y\|. \text{ Έστω } \|x\| \leq \|y\| \text{ και } x^* := x/\|x\|, y^* := y/\|y\|$$

τότε προφανώς  $\|x^*\| = \|y^*\| = 1$ , οπότε αν δείξουμε ότι

$$\|x^* + y^*\| \geq 2 \text{ η i δεν ισχύει. Τώρα:}$$

$$\begin{aligned} \|x^* + y^*\| &= \|x/\|x\| + y/\|y\|\| = \\ &= \| (x/\|x\| + y/\|x\|) - (y/\|x\| - y/\|y\|) \| \\ &\geq 1/\|x\| \|x+y\| - | 1/\|x\| - 1/\|y\| | \|y\| = \\ &= 1/\|x\| (\|x\| + \|y\|) - (1/\|x\| - 1/\|y\|) \|y\| = 2. \end{aligned}$$

{  $x^* \neq y^*$  διότι  $x^* = y^* \implies x \cdot \|y\| = y \cdot \|x\| = 0$ , που σημαίνει  $x, y$  γραμ. εξαρτημένα, άτοπο αν υποθέσουμε  $x, y$  ανεξάρτητα, αφού είναι άσπαστο

Σύμφωνα με το προηγούμενο λήμμα μπορούμε να ορίσουμε την αυστηρά κυρτότητα ως εξής:

2.8 Ορισμός Έστω  $(X, \|\cdot\|)$  ένας σταθμητός χώρος. Λέμε ότι η στάθμη  $\|\cdot\|$  είναι αυστηρά κυρτή (η μοναδιαία σφαίρα του  $(X, \|\cdot\|)$  είναι αυστηρά κυρτή, ο  $(X, \|\cdot\|)$  είναι αυστηρά κυρτός), αν ισχύει  $x, y \in X \quad \|x+y\| = \|x\| + \|y\| \implies x, y$  γραμμικά εξαρτημένα.

Δείχνουμε τώρα την μοναδικότητα της βέλτιστης προσέγγισης σε αυστηρά κυρτούς χώρους.

2.9 Θεώρημα Έστω  $(X, \|\cdot\|)$  ένας αυστηρά κυρτός σταθμητός χώρος. Αν  $X_1$  είναι ένας υπόχωρος του  $X$ , τότε για κάθε  $x \in X$  υπάρχει το πολύ μια βέλτιστη προσέγγιση του  $x$  από τον  $X_1$ .

Απόδειξη

Για  $x \in X_1$  η μοναδική βέλτιστη προσέγγιση του  $x$  από τον  $X_1$  είναι προφανώς το ίδιο το  $x$ . Έστω λοιπόν  $x \notin X_1$  και  $x', x'' \in X_1$  βέλτιστες προσεγγίσεις του  $x$  από τον  $X_1$ , δηλαδή

$$\|x-x'\| = \|x-x''\| = d(x, X_1). \text{ Τότε έχουμε}$$

$$\|x - (x'+x'')/2\| = \|(x-x')/2 + (x-x'')/2\| \leq 1/2 (\|x-x'\| + \|x-x''\|) = d(x, X_1),$$

άρα

$$\|(x-x') + (x-x'')\| = 2 d(x, X_1) = \|x-x'\| + \|x-x''\|.$$

Συνεπώς  $x-x' = \lambda(x-x'')$ , δηλαδή  $(1-\lambda)x = x' - \lambda x''$ , οπότε αναγκαστικά  $\lambda=1$ , άρα  $x'=x''$ .

Δείχνουμε τώρα και το αντίστροφο του ανωτέρω θεωρήματος.

2.10 Θεώρημα Έστω  $(X, \|\cdot\|)$  ένας μη αυστηρά κυρτός χώρος. Τότε υπάρχει ένας υπόχωρος  $X_1$  του  $X$  και ένα  $x \in X$ , τέτοια ώστε να υπάρχουν δύο (συνεπώς άπειρες) βέλτιστες προσεγγίσεις του  $x$  από τον  $X_1$ .

Απόδειξη


Αφού ο  $(X, \|\cdot\|)$  δεν είναι αυστηρά κυρτός υπάρχουν σύμφωνα με τον ορισμό 2.6 δύο στοιχεία  $y, z \in X$ ,  $y \neq z$  με  $\|y\| = \|z\| = \|(y+z)/2\| = 1$ . Θέτουμε τώρα  $X_1 := \text{span}(y-z)$  ( $:= \{\alpha(y-z) : \alpha \in \mathbb{R}\}$ ), και  $x := -z$  και θα δείξουμε ότι  $0$  και  $y-z$  είναι βέλτιστες προσεγγίσεις του  $x$  από τον  $X_1$ .

Με  $u_1 := 0$ ,  $u_2 := y-z$ ,  $u := (y-z)/2$  έχουμε  $\|x-u_1\| = \|x-u_2\| = \|x-u\|$ .

Πράγματι:  $\|x-u_1\| = \|x\| = \|-z\| = \|z\| = 1$ ,

$$\|x-u_2\| = \|-z-(y-z)\| = \|-y\| = \|y\| = 1,$$

$$\|x-u\| = \|-z-(y-z)/2\| = \|-(y+z)/2\| = \|y+z\|/2 = 1.$$



Υποθέτουμε τώρα ότι υπάρχει  $u \in X_1$  τέτοιο ώστε  $\|x-u\| < \|x-u_1\|$ . Επειδή

$$u \in X_1 \setminus \{u_1, u_2\} \exists k \in (1, 2) \exists \lambda \in (0, 1) \quad u = \lambda u_k + (1-\lambda)u$$

(εφότι  $u \in X_1 \implies u = k u_2$ . Αν  $k > 1/2$  το  $u$  γράφεται σαν κυρτός συνδυασμός των  $u_1$  και  $u$ , αν  $k < 1/2$  το  $u$  γράφεται σαν κυρτός συνδυασμός των  $u_2$  και  $u$ ) έχουμε:

$$\|x-u\| = \|\lambda(x-u_k) + (1-\lambda)(x-u)\| \leq \lambda \|x-u_k\| + (1-\lambda) \|x-u\|$$

$$< \lambda \|x-u\| + (1-\lambda) \|x-u\| = \|x-u\|, \text{ άτοπο.}$$

Συνεπώς  $u_1$  και  $u_2$  είναι βέλτιστες προσεγγίσεις του  $x$  από τον  $X_1$ .

**Παρατήρηση** Το πρόβλημα της προσεγγίσεως από έναν υπόχωρο λύνεται σε έναν αυστηρά κυρτό σταθμητό χώρο μονοσήμαντα (υπάρχει δηλαδή για κάθε  $x$  το πολύ μια βέλτιστη προσέγγιση από έναν υπόχωρο). Υπάρχουν όμως και σε μη αυστηρά κυρτούς χώρους υπόχωροι για τους οποίους το εν λόγω πρόβλημα λύνεται επίσης μονοσήμαντα (ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί για κάθε υπόχωρο είδαμε ήδη στο θεώρημα 2.10). Τέτοια παραδείγματα θα δούμε στην τέταρτη παράγραφο αυτού του μαθήματος.

Ας δούμε τώρα μερικά παραδείγματα αυστηρά κυρτών και μη αυστηρά κυρτών σταθμητών χώρων.

**Παραδείγματα αυστηρά κυρτών σταθμητών χώρων.**

Εστω  $p \in (1, +\infty)$ . Οι σταθμητοί χώροι

- i.  $(C[a,b], \|\cdot\|_p)$  ,
- ii.  $(C[a,b], \|\cdot\|_{p,r})$  και
- iii.  $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$

είναι αυστηρά κυρτοί. Για τον  $(C[a,b], \|\cdot\|_p)$ , η απόδειξη θάβηκε ήδη όταν αποδείξαμε την ανισότητα του Minkowski. Στις άλλες δύο περιπτώσεις η απόδειξη είναι ανάλογη.

**Παραδείγματα μη αυστηρά κυρτών σταθμητών χώρων**

Οι σταθμητοί χώροι  $(C[a,b], \|\cdot\|_1)$ ,  $(C[a,b], \|\cdot\|_\infty)$ ,  $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ ,  $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$  δεν είναι αυστηρά κυρτοί.

Δίνουμε την απόδειξη μόνο για τους χώρους  $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$ ,  $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ , ανάλογες είναι οι αποδείξεις στις δύο άλλες περιπτώσεις.

- i.  $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ . Έστω  $f(x) := x$ ,  $\varphi(x) := x^2$ . Οι  $f, \varphi$  είναι προφανώς γραμμικά ανεξάρτητες και έχουμε:

$$\|f+\varphi\|_\infty = \max_{0 \leq x \leq 1} |x+x^2| = 2, \quad \|f\|_\infty + \|\varphi\|_\infty = 1+1 = 2, \text{ συνεπώς}$$

$$\|f+\varphi\|_\infty = \|f\|_\infty + \|\varphi\|_\infty.$$

- ii.  $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$ . Έστω πάλι  $f(x) := x$ ,  $\varphi(x) := x^2$ . Τότε

$$\|f+\varphi\|_1 = \int_0^1 (x+x^2) dx = \int_0^1 x dx + \int_0^1 x^2 dx = \|f\|_1 + \|\varphi\|_1.$$

Ασκήσεις

- 2.1 Στον  $(\mathbb{R}^3, \|\cdot\|_\infty)$  προσδιορίστε όλες τις βέλτιστες προσεγγίσεις του  $x := (1, 2, 3)$  από τον  $X_1 := \{ (a_1, a_2, 0) : a_1, a_2 \in \mathbb{R} \}$ .  
Πώς εξηγείται το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές βέλτιστες προσεγγίσεις;
- 2.2 Έστω  $(X, \|\cdot\|)$  ένας σταθμητός χώρος,  $K$  ένα μη κενό κλειστό υποσύνολο του  $X$  με  $K \subset X_1$  όπου  $X_1$  υπόχωρος του  $X$  πεπερασμένης διαστάσεως.  
Δείξτε ότι για κάθε  $x \in X$  υπάρχει μια βέλτιστη προσέγγιση  $x'$  του  $x$  από το  $K$ .
- 2.3 Έστω  $q_k: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $q_k(x) := x^k$ ,  $k=1, 3$ . Προσδιορίστε τις βέλτιστες προσεγγίσεις του  $q_3$  από τον  $X := \text{span}(q_1)$  ως προς τις στάθμες  $\|\cdot\|_\infty$  και  $\|\cdot\|_1$  του  $C[1, 2]$ .