

ΑΛΓΕΒΡΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ #12

Πρόβλημα 1. Να βρεθεί ο μ.κ.δ.($f(x), g(x)$) των παρακάτω πολυωνύμων του $\mathbb{Q}[x]$ και να εκφραστεί στην μορφή μ.κ.δ.($f(x), g(x)$) = $\alpha(x)f(x) + \beta(x)g(x)$.

- α) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 2$, $g(x) = x^2 - 5x + 6$.
β) $f(x) = x^5 + 3x^2 + 1$, $g(x) = x^2 - 1$.

Πρόβλημα 2. Να βρεθεί ο μ.κ.δ.($f(x), g(x)$) των πολυωνύμων $f(x) = x^{12} + 1$, $g(x) = x^9 + 1$ του $\mathbb{Z}_3[x]$ και να εκφραστεί στην μορφή μ.κ.δ.($f(x), g(x)$) = $\alpha(x)f(x) + \beta(x)g(x)$.

Πρόβλημα 3. Γράψτε το πολυώνυμο $\bar{2}x^3 + x^2 + \bar{2}x + \bar{2}$ ως γινόμενο αναγώγων πολυωνύμων στον δακτύλιο $\mathbb{Z}_5[x]$.

Πρόβλημα 4. α) Δείξτε ότι το πολυώνυμο $x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ διαιρεί το πολυώνυμο $f(x) = x^5 - \bar{2}x^4 + x^3 - x^2 + \bar{2}x + \bar{4} \in \mathbb{Z}_5[x]$.
β) Γράψτε το πολυώνυμο $f(x)$ ως γινόμενο αναγώγων πολυωνύμων στον δακτύλιο $\mathbb{Z}_5[x]$.

Πρόβλημα 5. Γράψτε το πολυώνυμο $x^4 - x^3 + 3x^2 - x - 2$ ως γινόμενο αναγώγων πολυωνύμων στον δακτύλιο $\mathbb{Q}[x]$.

Πρόβλημα 6. Γράψτε το πολυώνυμο $x^4 - 1 \in F[x]$ ως γινόμενο αναγώγων πολυωνύμων στον δακτύλιο $F[x]$ για τις περιπτώσεις α) $F = \mathbb{Q}$, β) $F = \mathbb{R}$, γ) $F = \mathbb{C}$, δ) $F = \mathbb{Z}_3$.