

Διάδοση σε ελαστικούς
χώρους

Φαινόμενα ανάκλασης
και διάθλασης

Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία

$$\nabla \times \nabla f = 0$$

$$-\nabla p_1 = \rho_0 \frac{\partial \vec{u}_1}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{u} = 0$$

$$\vec{u} = \nabla \Phi_u$$

$$\vec{d} = \nabla \Phi \quad \Delta \text{υναμικό μετατόπισης}$$

$$E \equiv \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

Μέτρα ελαστικότητας

$$K = -V \frac{\partial p}{\partial V}$$

Μέτρο διόγκωσης

$$c = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$$

$$\vec{d} = \nabla \Phi$$

$$p_1 = -K \nabla \cdot d \quad \text{Νόμος Hooke}$$

$$p_1 = -K \nabla^2 \Phi$$

$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2}$$

$$K = \rho c^2$$

$$p_1 = -\rho \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2}$$

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial d_i}{\partial x_j} + \frac{\partial d_j}{\partial x_i} \right)$$

$$\sigma_{ij} = \lambda \delta_{ij} \varepsilon_{kk} + 2\mu \varepsilon_{ij} \quad \text{Νόμος Hooke}$$

$$\varepsilon_{kk} = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} \quad \text{Ανηγμένη διόγκωση}$$

$$\sigma_{ij} = \lambda \delta_{ij} \varepsilon_{kk} + \mu \left(\frac{\partial d_i}{\partial x_j} + \frac{\partial d_j}{\partial x_i} \right)$$

2^{ος} Νόμος Newton



$$\rho \frac{\partial^2 d_i}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}$$

$$\rho \frac{\partial^2 \vec{d}}{\partial t^2} = (\lambda + 2\mu) \nabla(\nabla \cdot \vec{d}) - \mu \nabla \times (\nabla \times \vec{d})$$

Περιστροφή :



$$\nabla^2(\nabla \times \vec{d}) - \frac{1}{c_s^2} \frac{\partial^2(\nabla \times \vec{d})}{\partial t^2} = 0$$

$$c_s^2 = \frac{\mu}{\rho}$$

Απόκλιση :



$$\nabla^2(\nabla \cdot \vec{d}) - \frac{1}{c_p^2} \frac{\partial^2(\nabla \cdot \vec{d})}{\partial t^2} = 0$$


$$c_p^2 = \frac{\lambda + 2\mu}{\rho}.$$

$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{c_p^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2}$$


$$\nabla^2 \Psi = \frac{1}{c_s^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}$$

$$\vec{d} = \nabla \Phi + \nabla \times \Psi$$


Διάδοση επίπεδου διατμητικού κύματος



Προβολή διάδοσης σφαιρικού διατμητικού κύματος στο επίπεδο



Φαινόμενα Ανάκλασης και Διάδοσης σε διεπιφάνειες



$$\Delta R_2 = \Delta x \sin \theta_2$$

$$\Delta R_1 = \Delta x \sin \theta_1$$

$$\frac{\Delta R_1}{\sin \theta_1} = \frac{\Delta R_2}{\sin \theta_2}$$

$$c_1 = \frac{\Delta R_1}{\Delta t}$$


$$c_2 = \frac{\Delta R_2}{\Delta t}$$




$$\frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

$$\sigma_{zz} = \lambda \nabla^2 \Phi + 2\mu \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z \partial x} \right)$$

$$\sigma_{zx} = \mu \left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z \partial x} \right)$$






Φ_{1i} Δυναμικό προσπίπτοντος ακουστικού κύματος

Φ_{1r} Δυναμικό ανακλώμενου ακουστικού κύματος

Φ_2 Δυναμικό διαδιδόμενου ακουστικού κύματος

Ψ_2 Δυναμικό διαδιδόμενου διατμητικού κύματος



$$\Phi_{1l} = e^{i(k_{x1}x + k_{z1}z - \omega t)}$$

$$\Phi_{1r} = R_{12} e^{i(k_{x1}x - k_{z1}z - \omega t)}$$

$$\Phi_2 = T_p e^{i(k_{x2}x + k_{z2}z - \omega t)}$$

$$\Psi_2 = T_s e^{i(k_{x2}x + k_{sz2}z - \omega t)}$$

$$k_1 = \frac{\omega}{c_1}$$

$$k_{p2} = \frac{\omega}{c_{p2}}$$

$$k_{s2} = \frac{\omega}{c_{s2}}$$

$$k_{x1} = k_{x2} = k_x$$

$$\sigma_{1,zz} - p_1 = \sigma_{2,zz}$$

$$\sigma_{2,zx}=0$$

$$d_{1z} = d_{2z}$$

$$\vec{d} = \nabla\Phi + \nabla\times\Psi$$

$$\sigma_{zz} = \lambda\nabla^2\Phi + 2\mu\left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial z^2} - \frac{\partial^2\Psi}{\partial z\partial x}\right)$$

$$\sigma_{zx} = \mu\left(\frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2} - \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2\Phi}{\partial z\partial x}\right)$$

$$-\rho_1 \frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial t^2} + \frac{\lambda}{c_p^2} \frac{\partial^2 \Phi_2}{\partial t^2} + 2\mu \left(\frac{\partial^2 \Phi_2}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \Psi_2}{\partial z \partial x} \right) = 0$$

$$\mu \left(\frac{\partial^2 \Psi_2}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \Psi_2}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 \Phi_2}{\partial z \partial x} \right) = 0$$

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial z} = \frac{\partial \Phi_2}{\partial z} - \frac{\partial \Psi_2}{\partial x}$$

$$\Phi_1 = \Phi_{1i} + \Phi_{1r}$$

$$R_{12} = \frac{4k_{z2}k_{sz2}k_x^2 + (k_{sz2}^2 - k_x^2)^2 - (\rho_1/\rho_2)(k_{z2}/k_{z1})(\omega^4/c_{s2}^4)}{4k_{z2}k_{sz2}k_x^2 + (k_{sz2}^2 - k_x^2)^2 + (\rho_1/\rho_2)(k_{z2}/k_{z1})(\omega^4/c_{s2}^4)}$$

$$u = e^{iax} \quad a = ia_1, a_1 \in R^+ \quad u = e^{-a_1 x}$$

$$k_{p2} > k_{z2}, \quad k_{p2} > k_x, \quad k_{s2} > k_{zs2}, \quad k_{s2} > k_x$$

$$c_{p2}>c_1$$

$$\sin\theta_2=\frac{c_{p2}}{c_1}\sin\theta_1$$

$$k_{z2}=ig_2~,~~~k_{sz2}=id_2$$

$$R_{12}=-e^{2in}$$

$$n=Arc\tan\{\frac{\rho_2}{\rho_1}\frac{\kappa_{z1}}{g_2}\frac{{c_{s2}}^4}{\omega^4}[-4g_2d_2{k_x}^2+(d_2^2+{k_x}^2)^2]\}$$

Περίπτωση Ρευστού Πυθμένα

$$\Phi_{1l} = e^{i(k_x x + k_{z1} z - \omega t)}$$

$$\Phi_{1r} = R_{12} e^{i(k_x x - k_{z1} z - \omega t)}$$

$$\Phi_2 = T_p e^{i(k_x x + k_{z2} z - \omega t)}$$

$$p_1=p_2$$

$$d_{1z}=d_{2z}$$

$$\frac{\lambda_1}{{c_1}^2}\frac{\partial^2\Phi_1}{\partial t^2}=\frac{\lambda_2}{{c_2}^2}\frac{\partial^2\Phi_2}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial z} = \frac{\partial \Phi_2}{\partial z}$$

$$\Phi_1 = \Phi_{1i} + \Phi_{1r}$$

$$-\rho_1\omega^2\{e^{i(k_x x+k_{z1} z-\omega t)}+R_{12}e^{i(k_x x-k_{z1} z-\omega t)}\}=-\rho_2\omega^2T_p e^{i(k_x x+k_{z2} z-\omega t)}$$

$$ik_{z1}\{e^{i(k_x x+k_{z1} z-\omega t)}-R_{12}e^{i(k_x x-k_{z1} z-\omega t)}\}=ik_{z2}T_p e^{i(k_x x+k_{z2} z-\omega t)}$$

$$\rho_1(1+R_{12})=\rho_2 T_p$$

$$k_{z1}(1-R_{12})=k_{z2}T_p$$

$$R_{12} = \frac{k_{z1}\rho_2 - k_{z2}\rho_1}{k_{z1}\rho_2 + k_{z2}\rho_1}$$

$$T_p = \frac{2k_{z1}\rho_1}{k_{z1}\rho_2 + k_{z2}\rho_1}$$

$$k_{z1} = k_1 \cos \theta_1 = \frac{\omega}{c_1} \cos \theta_1$$

$$k_{z2} = k_2 \cos \theta_2 = \frac{\omega}{c_2} \cos \theta_2$$

$$R_{12} = \frac{\rho_2 c_2 \cos \theta_1 - \rho_1 c_1 \cos \theta_2}{\rho_2 c_2 \cos \theta_1 + \rho_1 c_1 \cos \theta_2}$$


$$\sin \theta_2 = \frac{c_2}{c_1} \sin \theta_1$$


$$\cos \theta_2 = \sqrt{1 - (\frac{c_2}{c_1})^2 \sin^2 \theta_1}$$


$$\theta_{cr} = Arc \sin \frac{c_1}{c_2}$$


$$R_{12} = \frac{k_{z1}\rho_2 - ig_2\rho_1}{k_{z1}\rho_2 + ig_2\rho_1}$$

$$R_{12} = -e^{2i\chi} \qquad \qquad \qquad \chi = Arc \tan(\frac{\rho_2}{\rho_1} \frac{k_{z1}}{g_2})$$









$$R_{12} = \frac{\rho_2 c_2 \cos \theta_1 - \rho_1 c_1 \cos \theta_2}{\rho_2 c_2 \cos \theta_1 + \rho_1 c_1 \cos \theta_2}$$

$$R_{23} = \frac{\rho_3 c_3 \cos \theta_2 - \rho_2 c_2 \cos \theta_3}{\rho_3 c_3 \cos \theta_2 + \rho_2 c_2 \cos \theta_3}$$

$$T_{12} = \frac{2\rho_1 c_2 \cos \theta_1}{\rho_2 c_2 \cos \theta_1 + \rho_1 c_1 \cos \theta_2}$$

$$T_{23} = \frac{2\rho_2 c_3 \cos \theta_2}{\rho_3 c_3 \cos \theta_2 + \rho_2 c_2 \cos \theta_3}$$

$$2k_2 h_2 \cos\theta_2 = 2k_{z2} h_2$$

$$R_{12}=-R_{21}$$

$$T_{12}T_{21}=1-{R_{12}}^2$$

$$R_{13}=R_{12}+T_{12}T_{21}R_{23}\exp(2i\phi_2)+T_{12}T_{21}{R_{23}}^2R_{21}\exp(4i\phi_2)+\dots$$

$$\phi_2=k_2 h_2 \cos\theta_2$$

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} r^n = (1 - r)^{-1} \quad r < 1$$

$$R_{13} = R_{12} + T_{12}T_{21}R_{23} \exp(2i\phi_2) \sum_{n=0}^{\infty} [R_{23}R_{21} \exp(2i\phi_2)]^n$$

$$R_{13} = \frac{R_{12} + R_{23} \exp(2i\phi_2)}{1 + R_{12}R_{23} \exp(2i\phi_2)}$$

$$T_{13} = \frac{T_{12}T_{23} \exp(i\phi_2)}{1 + R_{12}R_{23} \exp(2i\phi_2)}$$

$$R_{(n-2)n} = \frac{R_{(n-2)(n-1)} + R_{(n-1)n} \exp(2i\phi_{n-1})}{1 + R_{(n-2)(n-1)} R_{(n-1)n} \exp(2i\phi_{n-1})}$$

$$R_{(n-3)n} = \frac{R_{(n-3)(n-2)} + R_{(n-2)n} \exp(2i\phi_{n-2})}{1 + R_{(n-3)(n-2)} R_{(n-2)n} \exp(2i\phi_{n-2})}$$

$$R_{1n} = \frac{R_{12} + R_{2n} \exp(2i\phi_2)}{1 + R_{12} R_{2n} \exp(2i\phi_2)}$$

